

Estadística Descriptiva



José Antonio Perusquía Cortés

Inferencia Estadística Semestre 2025-I




Datos y variables

Tipos de
variables

Cualitativas

Cuantitativas

Datos y variables



¿ Qué es la estadística descriptiva ?




¿ Qué es la estadística descriptiva ?


Analizar los datos




¿ Qué es la estadística descriptiva ?



¿ Qué es la estadística descriptiva ?



¿ Qué es la estadística descriptiva ?



Medidas numéricas

Tendencia
Central

Localización

Dispersión

Forma

Correlación

Medidas de tendencia central

- Indican el valor donde se centran los datos e.g.:

- **Media** (o promedio):

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

- **Mediana**: El valor de en medio

$$\text{med}(\mathbf{x}) = \begin{cases} x_{\left(\frac{n+1}{2}\right)} & \text{si } n \text{ es par} \\ \frac{1}{2} \left(x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n}{2}+1\right)} \right) & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

- **Moda**: El valor más repetido

Medidas de localización

- Indican los valores que dividen la muestra ordenada e.g. :
 - **Cuartiles** : Son los tres valores que dividen las observaciones en cuatro partes iguales y usualmente denotados por $q_{.25}$, $q_{.50}$ (mediana) y $q_{.75}$
 - **Deciles** : Son los nueve valores que dividen la muestra en 10 partes iguales
 - **Percentiles** : Son los 99 valores que dividen la muestra en 100 partes iguales

Medidas de dispersión

- Indican la variabilidad de los datos e.g.:

- **Desviación estándar**

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

- **Rango**: Definido como $r = x_{(n)} - x_{(1)}$




- **Rango intercuartílico**: Utilizado para identificar valores atípicos y definido como

$$\text{IQR} = q_{.75} - q_{.25}$$

- **Coefficiente de variación**: Utilizado para comparar las distribuciones y definido como σ/\bar{x}

Medidas de forma

- Nos indican la forma de la distribución :
 - **Curtois** : Mide que tan achatada es una distribución en relación a una distribución guassiana cuya curtois es 3
 - **Mesocúrtica** : Si la curtois es igual a 3
 - **Platicúrtica** : Si la curtois es menor a 3
 - **Leptocúrtica** : Si la curtois es mayor a 3



Medidas de forma




- Nos indican la forma de la distribución :

- Coeficiente de asimetría (o sesgo)

- ▶ **Simétrica** : si el coeficiente es cero.

- ▶ **Asimétrica negativa** (o a la izquierda) : si el coeficiente es menor a cero.

- ▶ **Asimétrica positiva** (o a la derecha) : si el coeficiente es mayor a cero.



Medidas de correlación

- Miden el grado de efecto de una variable en otra :
 - **Coefficiente de Pearson.** Medida paramétrica utilizada para cuantificar la relación lineal de dos variables.
 - **Coefficiente ρ de Spearman.** Medida de dependencia no paramétrica, que utiliza los rangos entre los valores de las variables para estudiar la relación monotónica de dos variables.
 - **Coefficiente τ de Kendall.** Medida de dependencia no paramétrica para estudiar la relación monotónica de dos variables. Preferible para cuando hay pocas observaciones o empates.

Representaciones gráficas

Tabla de
frecuencias

Gráfica de
barras

Histograma

Box plot

Pie/Pastel/
Dona

Diagrama de
dispersión

Diagrama de
correlación



Diagrama de
tallo y hojas

¡Muchas más!

Tabla de frecuencias


- Útiles para resumir la información de variables categóricas
- Para una muestra x_1, \dots, x_n
 - Se encuentran los valores únicos x_1^*, \dots, x_k^*
 - Se cuenta el número de veces que estos valores únicos ocurren (**frecuencias**) y se denotan por f_1, \dots, f_k de tal forma que $f_1 + \dots + f_k = n$
 - También se pueden obtener las **frecuencias relativas** $f_i^* = f_i/n$ de tal forma que $f_1^* + \dots + f_k^* = 1$
 - Se obtienen las **frecuencias acumuladas** como $F_i = f_1^* + \dots + f_i^*$
- Las frecuencias (relativas) se utilizan para construir las gráficas de barras, de pie, de pastel y dona

Gráficas de barras y pie/pastel/dona





Histogramas

- Representación gráfica de la densidad empírica



Histogramas

- Representación gráfica de la densidad empírica




Histogramas

- Requiere una tabla de frecuencias utilizando intervalos en lugar de valores únicos
 - Obtener el rango de los datos
 - Seleccionar el número de clases M (e.g. $M = \sqrt{n}$ o $M = \log(n) + 1$)
 - Crear los intervalos y contar el número de observaciones que caen en dichos intervalos y que jugarán el papel de las **frecuencias** f_1, \dots, f_M
 - (Opcional) Calcular las **frecuencias relativas** f_1^*, \dots, f_M^*
 - Calcular la **marca de clase** dado por el punto medio del intervalo
 - Crear una gráfica de barras con cada barra centrada en la marca de clase y altura dada por las frecuencias (absolutas o relativas)



Box plot

- Representación gráfica de los datos a partir de los cuartiles



Box plot

- Representación gráfica de los datos a partir de los cuartiles




Box plot


- Muestra información del mínimo, máximo, mediana, de la simetría de la densidad así como de valores atípicos
 - Obtener el mínimo, el máximo y los cuartiles
 - Dibujar una caja empezando por el primer cuartil y terminado en el tercer cuartil
 - Dibujar una recta horizontal (o vertical) dentro de la caja a la altura del segundo cuartil
 - Dibujar una recta del mínimo al primer cuartil y del máximo al tercer cuartil
 - Calcular el rango intercuartílico e identificar como valores atípicos aquellos valores que sean menores a $q_{.25} - 1.5 * IQR$ y mayores a $q_{.75} + 1.5 * IQR$

Software

Lenguajes



IDE



Notebooks



En este curso

Paqueterías:

- ggplot2
- dplyr
- plyr
- tidyverse

